

La gravidanza: le FAQ

Sintomi gravidanza

Salve...leggendo le domande poste nella sezione "i sintomi della gravidanza" e le relative risposte non ho trovato un caso che possa associarsi al mio. Circa una settimana fa ho avuto una sorta di rapporto con la mia ragazza, dico così perché inizialmente giocavamo un po' ma poi accidentalmente il pene è entrato, non del tutto, cioè è penetrata solamente la parte iniziale del pene, ma è stata questione di un secondo e mi sono subito tolto, premetto che non ci sono state emissioni di sperma prima dell'accaduto (ma forse qualche perdita di liquido lubrificante, anche se comunque il pene dovrebbe essere entrato nel momento in cui era asciutto). La mia ragazza non ha ancora avuto le mestruazioni, si tratta di un ritardo di un solo giorno, però la cosa che mi preoccupa è che ha senso di vomito da un giorno pieno e parecchio sonno. Ora mi chiedo se il tutto possa dipendere da qualche banalissima influenza o peggio da un eventuale gravidanza, dico questo poichè la mia ragazza ha solo 16 anni e io 18.

Se l'unico rapporto a rischio è stato una settimana fa, i sintomi di una eventuale gravidanza non potrebbero ancora essere presenti (compaiono più tardivamente). Ciò non toglie che, se il flusso non compare, a distanza di 15-20 giorni dal rapporto, conviene fare un test.

Premettendo che la mia ragazza è in un periodo di studi intensi e il tempo da un forte caldo è passato al freddo, si trova in una situazione di ritardo di 10 giorni del ciclo mestruale. Rapporti a rischio non ce ne sono stati, se non preliminarmente e non volontari. Lei ha questi sintomi: male al seno, gonfiore di pancia, mal di schiena... Volevo sapere se avere questi sintomi mi immunizzano da un'eventuale gravidanza.

Se veramente non ci sono stati rischi di gravidanza non vedo perché preoccuparsi. Se però sussiste il minimo dubbio, la cosa più semplice è eseguire un test di gravidanza. Purtroppo i sintomi che mi descrivi non aiutano, perché possono essere comuni sia al periodo premestruale sia ad una gravidanza iniziale.

Salve! Durante il primissimo periodo di gravidanza, è possibile avvertire dei dolori al basso ventre e ai reni, similissimi a quelli del periodo premestruale? Ed è vero che la gravidanza nel primo periodo provoca il bisogno di urinare più spesso?

I sintomi che mi descrivi possono presentarsi nella gravidanza iniziale. Questo non vuol dire che compaiono in tutte le gravidanze.

Salve! Sono una ragazza di 16 anni e volevo sapere tutti i sintomi della gravidanza, dai primi a tutto il resto. Come faccio a scoprire se sono incinta senza fare test o andare da un ginecologo?

I sintomi di gravidanza sono molto specifici, cioè assomigliano molto ai sintomi premestruali: tensione al seno, raramente senso di nausea, ma a volte non compaiono neppure questi. L'unica certezza deriva da un test di gravidanza, che puoi comprare in farmacia ed eseguire tranquillamente in casa.

Ho avuto un rapporto con il mio ragazzo il nono giorno del ciclo. Per evitare una gravidanza siamo ricorsi al coito interrotto. Ora sono al 17mo giorno del ciclo e avverto tensione al seno e gonfiore alla pancia, nonché più appetito del solito. Dovrei iniziare a preoccuparmi?

Il coito interrotto non è un metodo sicuro, perché anche prima dell'eiaculazione può esserci una fuoriuscita di piccole gocce di liquido contenente spermatozoi. Per cui se le mestruazioni dovessero tardare è bene che tu faccia un test di gravidanza. Comunque i sintomi di cui parli possono benissimo essere quelli del periodo pre-mestruale.

Due giorni fa ho avuto un rapporto a rischio, vorrei sapere dopo quanto tempo sono visibili i primi effetti di una gravidanza e dopo quanti giorni un test di gravidanza può essere valido, cioè quando può dare risposte certe.

Il tempo di comparsa dei sintomi, che sono variabili e soggettivi; quello che invece è sicuro è il risultato del test di gravidanza che è valido a partire da 15 giorni dal rapporto a rischio.

E' possibile che io sia incinta anche se ho avuto le mestruazioni regolarmente?

In genere nei casi in cui la mestruazione si presenta anche in corso di gravidanza ha delle caratteristiche diverse per intensità e durata rispetto al solito flusso.

Volevo sapere anche quali sono i sintomi più frequenti dopo i primi giorni o dopo la mancata mestruazione se è una gravidanza.

La sintomatologia legata alla gravidanza è molto variabile e soggettiva; può anche mancare. Generalmente sono sintomi neurovegetativi, ad es. senso di nausea, cambiamenti del gusto e dell'odorato, sonnolenza. Il primo sintomo comunque rimane la mancata mestruazione e una tensione progressiva del seno.

Quando compaiono di norma i sintomi di una gravidanza?

I sintomi di una eventuale gravidanza possono comparire sicuramente non prima di 15 - 20 giorni dalla eventuale fecondazione. Fai tu i conti.

Test di gravidanza

Volevo sapere se esistono delle medicine che possono alterare o inficiare il test di gravidanza. Si può risultare positive a causa di medicine? Se sì quali? E in questo caso è meglio andare dal ginecologo anziché usare il classico test delle farmacie? Grazie.

Un falso risultato positivo si può avere talvolta solo in corrispondenza di un elevato picco dell'ormone ipofisario LH che ha una parte di molecola simile all'ormone della gravidanza. Questa eventuale interferenza non si ha se il test viene effettuato su sangue. Non ci sono medicine che interferiscono. Il test dà un risultato positivo prima che la gravidanza possa essere sicuramente confermata da una visita ginecologica.

Dal giorno del rapporto a rischio, quando è possibile fare un test di gravidanza?

I test di gravidanza sono validi se sono passati almeno 15 giorni dall'eventuale fecondazione. Un test di gravidanza fatto dopo il rapporto non serve a nulla.

Ho un ritardo del ciclo di 10 giorni. Ho effettuato il test di gravidanza che è risultato negativo. Vorrei sapere se i test di gravidanza sono sicuri al 100% o potrei anche essere incinta.

In medicina niente è al 100%. Comunque i test di gravidanza in commercio sono molto attendibili. Se ci sono dei seri sospetti eventualmente è consigliabile o una ripetizione del test dopo circa 7 giorni oppure l'esame del sangue.

Questo mese ho sbagliato a prendere la pillola: ho iniziato la scatola giovedì invece che venerdì, credevo di essere protetta e invece a

quanto pare non è così perché ho fatto il test ieri ed è risultato positivo. Ovviamente ho avuto rapporti a rischio circa due settimane fa. Sono incinta dunque? O prendendo la pillola può alterare il risultato e quindi essere un falso positivo? Grazie, rispondete il prima possibile per favore.

Per evitare errori, ti consiglio di portare le urine in farmacia e fare eseguire da loro il test.

Ho eseguito giovedì scorso un test di gravidanza dopo aver avuto un rapporto a rischio. Il test era negativo ma le mestruazioni non sono ancora arrivate. In questi giorni ho spesso lo stimolo di urinare e, dato che sono soggetta alla cistite, sospetto che si tratti di questo anche se non ho il classico fastidio tipico della cistite. Vorrei sapere se la cistite in qualche modo può alterare l'esito del test di gravidanza e se è il caso di ripeterlo.

No, la presenza o meno di infezioni delle vie urinarie non altera il test. Se comunque le mestruazioni non dovrebbero comparire anche alla prossima ricorrenza, ti consiglio di ripetere il test.

Vorrei sapere, se l'esame delle urine per vedere se la donna è incinta è negativo, c'è possibilità che sia incinta? Si possono avere falsi positivi o falsi negativi?

Sì, esiste la possibilità, ma soprattutto dei falsi positivi. Tante volte per i falsi negativi è perché non è trascorso il tempo sufficiente affinché l'ormone venga rilevato (almeno 15 gg dall'eventuale fecondazione). Per questo in genere le confezioni contengono 2 test, così se ci sono dei dubbi uno può ripeterlo dopo circa una settimana.

Dopo un rapporto a rischio, mi chiedevo se ci sono possibilità che la mia ragazza sia rimasta incinta... Poiché aveva già prenotato un'ecografia, cui si sottoporrà circa due settimane dopo il rapporto, volevo sapere se da tale ecografia si potrà già sapere qualcosa, o bisogna comunque fare il test di gravidanza?

No, con l'ecografia non è ancora possibile evidenziare nulla. E' il test che è attendibile dopo 15- 20 giorni.

Rapporti a rischio

Quanto possono ritardare le mestruazioni di una donna senza che sia necessariamente incinta? siccome provo vergogna ad andare in

farmacia, volevo sapere quanto costa il test e soprattutto se bisogna essere maggiorenni per comprarlo.

Un'ultima cosa, circa tre settimane fa ho avuto un rapporto con il mio ragazzo ma abbiamo usato la pratica del coito interrotto, esiste il rischio di essere rimasta incinta lo stesso visto che ho un ritardo di dieci giorni delle mestruazioni? grazie

La tua prima domanda non ha senso: tutti i ritardi possono essere di giorni o di mesi indipendentemente dalla causa. Il test lo puoi andare a comprare anche se sei minorenni, anzi te lo consiglio visto che c'è stato un rapporto a rischio e sei in ritardo. Ogni penetrazione senza profilattico è teoricamente a rischio. Il costo si aggira sui 15 euro circa.

Buonasera, soffro di anoressia nervosa con amenorrea continua ormai da 5 anni. Un mese fa ho avuto rapporti completi; abbiamo usato il preservativo ma mi è comunque sorto un dubbio. Nella mia situazione corro il rischio di rimanere incinta? Come potrei rendermene conto non avendo le mestruazioni? E' attendibile un test di quelli acquistati in farmacia?

Anche nella tua situazione non posso escludere al 100% che tu non possa rimanere incinta. Se non vuoi fare un test ogni mese (vanno bene quelli acquistati in farmacia), devi avere sempre rapporti protetti.

Vorrei sapere se è vero che l'urina è letale per gli spermatozoi. Detto questo...dopo un rapporto a rischio (coito interrotto) è logico inserire nella vagina dell'urina al fine di eliminare i possibili spermatozoi penetrati? Se la fecondazione è già avvenuta, può essere interrotta con questo metodo?

Introdurre qualsiasi sostanza in vagina non ha alcun senso, perché gli spermatozoi potenzialmente fecondanti sono quelli che penetrano nel collo dell'utero e che quindi non sono più raggiungibili.

Salve, vorrei un'informazione molto urgente... Il liquido che un ragazzo perde prima dell'eiaculazione è pericoloso? Si può rimanere incinta? Un'altra cosa: se non c'è penetrazione ma questo liquido viene a contatto leggermente con la vagina, è rischioso?

Alla prima domanda che poni, la risposta è sì; infatti nelle perdite che precedono l'eiaculazione sono contenuti spermatozoi, pertanto queste piccole perdite, che si possono verificare in qualunque momento del rapporto e che il maschio non avverte, sono potenzialmente fecondanti.

Alla seconda: la possibilità di rimanere incinta senza penetrazione è improbabile e si può realizzare soltanto se lo sperma viene a contatto con l'introito vaginale (di conseguenza potrebbe verificarsi l'ingresso di spermatozoi).

Si può rimanere incinta solo avendo rapporti sessuali non protetti?

Se non si vuole rimanere incinte bisogna usare un metodo contraccettivo sicuro. Ogni rapporto non protetto è a rischio.

Salve, sono una ragazza di 18 anni ed esattamente una settimana fa ho avuto un rapporto a rischio. Ho anche preso la pillola del giorno dopo circa 36 ore dal rapporto.

Volevo sapere se posso essere incinta nonostante ciò, e se sì come potrei interrompere la gravidanza senza ricorrere a metodi chirurgici.

La pillola del giorno dopo non dà una garanzia assoluta per cui se il flusso tarda è necessario eseguire un test di gravidanza. In Italia esiste una legge che regola il percorso da seguire nel caso d'interruzione volontaria di gravidanza. Prevede solo il metodo chirurgico.

Da un mese ho rapporti con un uomo che, a causa di un'operazione, è sterile. Ma ora ho un ritardo di 8 giorni. Devo preoccuparmi?

Dovrei sapere se l'intervento ha causato una infertilità assoluta o meno. Se c'è il minimo dubbio ti conviene fare il test.

Durante il periodo fertile, se il ragazzo dopo avere avuto un'eiaculazione tocca (penetrando) la ragazza ma le mani non sono pulite, c'è qualche rischio?

Se il liquido spermatico ancora fresco viene introdotto in vagina, il rischio c'è.

Se ho un rapporto anale completo posso rimanere incinta?

No. L'ano non è in contatto diretto né con la vagina né con l'utero.

Salve tutor. Sono una ragazza di 18 anni...vorrei una semplice informazione visto le mie scarse conoscenze in materia. Il periodo è quello fertile, purtroppo in pieno. Volevo sapere se avuto un rapporto con il mio ragazzo senza penetrazione, portando entrambi gli slip, c'era qualche possibilità di rimanere incinta...non so se c'è stato scambio di fluidi...ma la preoccupazione c'è. È motivata? grazie in anticipo per la sua disponibilità.

Se anche c'è stata fuoriuscita di liquido spermatico, non vedo come questo possa, per penetrare in vagina, superare gli slip. Tranquilla.

Gent.mo dottore, ho chiesto a un urologo/andrologo se il liquido prodotto dalle ghiandole del Cowper contiene spermatozoi. La sua risposta è stata: no. A questo punto vorrei sapere in quale liquido pre-eiaculatorio sono contenuti gli spermatozoi. Io credevo che questi ultimi venissero emessi dai testicoli solo al momento dell'orgasmo. Mi aiuterebbe a capire? Grazie mille.

Il liquido prodotto dalle ghiandole del Cowper non contiene spermatozoi, ma questi vi si possono trovare frammisti, filtrati dai dotti eiaculatori, in quantità tale da poter causare una gravidanza a eiaculazione non ancora avvenuta.

Periodo fertile

Si può rimanere incinta il primo giorno in cui si presentano le mestruazioni? Se sì, in che percentuale?

Non esiste un calcolo di percentuale preciso come tu chiedi. Comunque la sicurezza al 100% di non rimanere incinta, anche se nel primo giorno di mestruazione le possibilità sono scarsissime, non c'è in nessun giorno del ciclo. Per questo motivo è consigliabile usare sempre un contraccettivo sicuro.

Ho avuto un rapporto sessuale completo durante il ciclo mestruale (precisamente il secondo giorno) circa un mese fa, e sono in ritardo di 3 giorni, è possibile che io sia rimasta incinta?

Anche se le probabilità sono minime, effettivamente nessun giorno del ciclo è scevro dal rischio di gravidanza. Aspetta ancora un po' e se proprio non vengono fai un test di gravidanza.

Salve, è possibile che una ragazza rimanga incinta dopo un rapporto a rischio fatto il secondo giorno dopo il ciclo? Ed è possibile che si manifestino i sintomi di gravidanza dopo pochi giorni dal rapporto?

- 1) Anche se la probabilità è scarsa, in nessun giorno del ciclo il rischio di gravidanza è zero.
- 2) Non è possibile; se si presentano in genere compaiono dopo la mancata mestruazione.

Ho avuto da 2 mesi a questa parte delle strane perdite durate 1 settimana al seguito delle quali ho avuto le mestruazioni della solita durata di 2-3 giorni. Il calcolo del periodo fertile lo devo fare secondo il 14° giorno dal flusso importante oppure dal primo giorno in cui ho avuto delle perdite? Ho avuto paura di essere rimasta incinta non avendo fatto bene il calcolo del periodo fertile. In pratica, le perdite sono iniziate il 4 maggio e le mestruazioni vere e proprie le ho avute il 9. Con un ciclo di 30 giorni, il periodo fertile è il 20 o il 25 maggio? Vi sarei grata se mi deste questa informazione.

Forse non hai capito bene una cosa: la definizione del periodo fertile tramite il solo calcolo dei giorni è completamente non affidabile, per cui noi non lo consigliamo. Diverso è l'applicazione del metodo sinto termico che ci insegna a rilevare i segnali che il nostro corpo ci dà nel periodo ovulatorio. Inoltre non è solo un giorno il periodo fertile, ma calcolando il periodo di vita dell'ovulo e dello spermatozoo, è un periodo di 5-6 giorni intorno all'ovulazione stessa. Per capire bene queste cose è necessario un colloquio informativo (non posso fare un trattato di fisiologia della riproduzione per e-mail) per cui ti consiglio di recarti ad una sede consultoriale per chiarire tutti i tuoi dubbi. Ricordati comunque che noi consigliamo di avere rapporti protetti in ogni periodo del ciclo.

Ho preso la pillola anticoncezionale per due mesi, poi ho deciso di staccarla, volendo intraprendere una gravidanza. E' vero che è sconsigliabile rimanere incinta al primo mese dall'interruzione della pillola? Ho sentito dire che gli ormoni, non ancora del tutto smaltiti dall'organismo, possono fare male al feto. E ancora, è vero che al primo mese dall'interruzione, ci sono più possibilità di concepire, essendo le ovaie in maggiore operatività dopo mesi di inattività?

Se si vuole programmare, è preferibile aspettare un mese, ma non perché ci siano ancora ormoni circolanti, ma perché il rivestimento interno uterino subisca un ciclo normale; se una però rimane incinta subito, non c'è alcun problema. La pillola non ha nessuna influenza sulla fertilità della donna.

Pillola del giorno dopo

Vorrei chiedere se è vero che la pillola del giorno dopo fa ingrassare e se è efficace al 100 %. Grazie mille.

Non fa ingrassare. Non ha il 100% di efficacia e comunque la percentuale di riuscita è tanto maggiore tanto prima la si assume.

Ciao, sono una ragazza di 16 anni. Vorrei sapere da chi può essere prescritta la pillola del giorno dopo (anche dalla guardia medica?) e quali effetti collaterali può dare? Grazie mille.

Per la pillola del giorno dopo è necessaria la ricetta, per cui basta che sia un medico a prescriverla. Gli eventuali effetti collaterali in genere si limitano a sensazione di nausea, raramente vomito. È preferibile assumerla a stomaco pieno per cercare di evitarli.

Ho avuto un rapporto non sicuro il settimo giorno, poi ho preso la pillola del giorno dopo e entro una settimana (quindi il 15esimo giorno) ho avuto un ciclo con durata normale, ma dopo una settimana ho sensibilità e male al seno. Mi starei avvicinando a quella che era la data del ciclo regolare, ma è tanto tempo che non avevo sintomi così evidenti del ciclo (quando prendevo la pillola). Potrei essere ancora a rischio gravidanza?

Molto probabilmente il flusso a metà ciclo è stato dovuto alla fallita ovulazione causata dall'assunzione della pillola del giorno dopo. Può succedere, i sintomi che ora avverti, sono i classici del periodo premestruale. Aspetta tranquillamente e solo se non si presenta il flusso esegui per scrupolo un test di gravidanza.

Salve, ho avuto un rapporto a rischio e volevo alcuni chiarimenti circa la pillola del giorno dopo: basta solo prenderla una volta o bisogna prendere altro? Dopo quanto tempo bisogna prenderla dal rapporto? Influisce sulla sterilità della ragazza? Bisogna contattare necessariamente un medico o si può agire in modo autonomo. Spero le vostre risposte siano esaurienti vi ringrazio. P.s. Il rapporto è avvenuto da meno di 48 ore.

La pillola del giorno dopo va presa entro le 72 ore dal rapporto a rischio. Prima si prende maggiore è l'efficacia. La si acquista in farmacia dietro presentazione della ricetta medica, quindi il medico è indispensabile. Può essere sia un ginecologo sia un medico di base. Il medico fa un colloquio per verificare se il rapporto è stato a rischio oppure no e per fornire le istruzioni d'assunzione. Le pillole sono 2 da prendere a distanza di 12 ore l'una dall'altra. Non provoca sterilità nella donna.

Buon giorno. Volevo fare una semplice domanda. Ma la pillola del giorno dopo si può prendere in consultorio senza avere una prescrizione dal "medico di famiglia"? Ho bisogno di una risposta al più presto. Grazie mille!!!

Al Consultorio il ginecologo valuterà se è il caso di prescriverla ed eventualmente farà la ricetta direttamente senza passare dal medico di famiglia. Si può andare anche direttamente dal proprio medico se nelle vicinanze non c'è un Consultorio.

Interruzione di gravidanza

Come si fa ad abortire? A chi ci si deve rivolgere? Quanto costa un aborto? Quanto tempo occorre?

In Italia esiste una legge che regola il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza se vuoi puoi trovarla in diversi siti, tra cui il sito [diritto e famiglia](#). La procedura è gratuita. A meno che non si tratti di casi urgenti, i tempi sono variabili e dipendono dalle liste d'attesa dei vari ospedali.

Sono minorenne, vorrei abortire senza dirlo ai miei genitori perché non l'accetterebbero mai, compio 18 anni a dicembre, è possibile?

In Italia esiste una legge che stabilisce le norme per l'interruzione volontaria di gravidanza anche per le minori. Per questo ti devi rivolgere ad una struttura consultoriale dell'Azienda Sanitaria del tuo territorio dove troverai personale esperto che ti potrà aiutare e consigliare.

Solitamente ho il ciclo regolare ma ultimamente, dopo aver avuto dei rapporti completi con mio marito senza aver usato nessun contraccettivo, mi è tornato il ciclo abbondante con un anticipo di quattro giorni. A cosa sarà dovuto questo anticipo del ciclo? A qualche aborto spontaneo?

Non si può dire. Potrebbe essere un banalissimo anticipo. Più spesso gli aborti precoci avvengono con un lieve ritardo del flusso.

Salve sono un ragazzo di 18 anni. Circa 2 settimane fa durante un rapporto il preservativo si è rotto e sfortunatamente ce ne siamo accorti dopo. Adesso la mia ragazza ha un ritardo di 13 giorni e siamo preoccupati. La mia domanda è se in tal caso è possibile l'aborto con quali metodi e in quali sedi.

Prima di tutto eseguito un test di gravidanza e, se positivo, rivolgetevi ad una struttura consultoriale del Vostro territorio (Consultorio familiare dell'Azienda USL). Per il futuro sappiate che, in caso di rottura del profilattico esiste la possibilità di assumere la pillola del giorno dopo, entro massimo 72 ore, da richiedere presso una struttura sanitaria (medico curante, consultorio, PS, etc..)

Problemi in gravidanza

Sono una ragazza di 19 anni alla 32esima settimana di gravidanza. Pochi giorni fa ho avuto delle perdite liquide di colore bianco inodore, seguite dalla perdita di un grumo bianco più consistente (tipo cera). Tutto ciò è avvenuto il giorno dopo aver avuto un orgasmo seguito da leggere contrazioni che si ripetevano circa ogni 10 minuti per 6 volte. (Le premetto che da un po' di tempo combatto con fastidiosi pruriti da candida.) Il giorno che ho avuto le perdite sono stata in clinica dove mi hanno fatto una ecografia: il bambino non aveva rotto il sacco amniotico e per quanto riguardava quel grumo, mi hanno detto che poteva trattarsi di una parte del tappo mucoso. Devo preoccuparmi per un parto pretermine? E inoltre come dobbiamo regolarci con i rapporti sessuali ed eventuali orgasmi?

Non ci sono regole fisse predeterminate. Esiste invece un'autoregolazione. Se ti sei accorta che in questo periodo il rapporto ti provoca contrazioni, forse sarebbe meglio evitarlo per precauzione.

Volevo sapere se è possibile che durante i primi mesi della gravidanza (esattamente primo e secondo) ci siano perdite molto simili a quelle mestruali però ad intervalli più brevi (più o meno ogni 15 o 20 giorni).

La normalità in gravidanza è che non ci siano perdite di sangue. Può capitare a volte che nell'ambito del primo trimestre alla ricorrenza mestruale si verifichino piccole perdite ematiche di breve durata. Ogni altra perdita ematica va valutata opportunamente con un controllo ginecologico.

Io e mio marito desideriamo un bambino, è da un po' di tempo che ci proviamo ma non succede niente... volevo sapere se il fatto che fumiamo tutti e due potrebbe essere la causa del fatto che io non rimango incinta.

Il fumo non fa bene per altri motivi, ma nel tuo caso non c'è rapporto causa-effetto.

Sono rimasta incinta (fortunatamente), ma ho una paura matta di poter perdere il bambino visto che a una mia amica è successa questa cosa. Vorrei sapere quali sono le cose da evitare assolutamente per non incorrere nella stessa disgrazia.

La maggioranza degli aborti spontanei ha causa genetica, non sono causati da comportamenti a rischio. Vivi la tua gravidanza tranquillamente. È chiaro

che in gravidanza si cercano di evitare situazioni che possono comportare un maggior rischio di traumatismo (es: equitazione, sci etc).

Test di paternità

Volevo sapere se una ragazza che è incinta da 1 mese o 2 si può già sapere chi è il padre? Grazie mille

Se l'intento della domanda è sapere se in caso di dubbio di paternità esiste un esame che permetta di stabilirlo a questa epoca, la risposta è no.